

## HYPOPHYLLOCERAS APTIENSE (Sayn - 1920)

### SAYN G.

Contributions à l'étude des céphalopodes paleocrétacés du Sud-Est de la France (Matériaux pour servir à la connaissance du Crétacé inférieur).

Mém. pour servir à l'expl. de la Carte Géol. détaillée de la France, 1920, p.195 -196

Pl. I, Fig. 4 – 4 a

### PHYLLOCERAS APTIENSE nov. sp.

Espèce très commune dans tous les gisements appartenant au type dit Oriental : Hyèges, Blieux, Moriez, St-André, Vergons ; beaucoup plus rare dans ceux du type dit Occidental, par exemple à Carniol et à Gargas.



Fig. 2. — *Phylloceras Aptiense* nov. sp.

Cloison au diamètre de 31 millimètres.

### Diagnose :

J'inscris sous ce nom un *Phylloceras* qui ressemble beaucoup comme forme extérieure à *Ph. Thetys* et ne s'en distingue que par son ombilic un peu plus large, ses flancs moins comprimés et la présence dans le jeune âge de sillons obsolètes qui persistent plus ou moins longtemps suivant les individus. Comme chez l'espèce du Valanginien, la région siphonale est ornée de stries fines et séparées par des intervalles plus larges qu'elles-mêmes; le stade juvénile à large ombilic et tours étroits disparaît rapidement et de bonne heure; la coquille est très involute.

La ligne suturale est presque identique à celle de *Phyll. Gaetardi* telle que l'a figurée D'ORBIGNY et rappelle beaucoup celle de *Ph. Calypso*; la première selle latérale est nettement triphyllique; le corps des selles est large et relativement massif.

