

HYPOPHYLLOCERAS FORTUNEI (Honorat-Bastide - 1892)

HONNORAT-BASTIDE E. F.

Sur une forme nouvelle de céphalopodes du Crétacé inférieur des Basses-Alpes. Feuille des Jeunes Naturalistes, 22^e année, n°264, p. 241-242 (1892)

Diagnose originale :

Sur une forme nouvelle de Céphalopodes du Crétacé inférieur des Basses-Alpes. — *Ammonites Fortunei* nov. sp. — Coquille comprimée, à un tour; paraît lisse, sur les adultes, vers l'ombilic jusqu'au milieu des flancs, d'où semblent naître, à partir de là, des côtes fines ou stries très nombreuses qui passent sur le dos, ombilic orné, sur les jeunes, de côtes assez prononcées et assez espacées, qui se bifurquent vers le milieu du tour de la spire en un très grand nombre de petites côtes ou stries formant faisceau, au nombre de quatre à cinq et plus (1); les grosses comme les petites côtes ont très peu de relief et ne sont guère que des stries; les grosses côtes se confondent souvent avec les côtes intermédiaires, dont elles restent quelquefois

distinctes; les côtes sont inclinées en avant jusqu'à leur bifurcation, où elles décrivent un coude très ouvert à concavité tournée en arrière; à partir de la bifurcation elles vont en arrière; puis elles reviennent vers le dos en s'infléchissant en avant, après avoir formé une courbe gracieuse sur les flancs à concavité dirigée vers la bouche; chez les adultes, les grosses côtes forment un léger bourrelet ou renflement vers le point de leur bifurcation. Ombilic très évasé chez les unes, plus étroit chez d'autres. Dos arrondi, comprimé par rapport aux flancs qui sont très prononcés et très renflés et vont en diminuant vers le dos. Cloisons très digitées, découpées en huit lobes très ramifiés sur chaque face; les détails de ces lobes ne sont pas très distinctement visibles sur les exemplaires que je possède.



Tours se recouvrant fortement (du tiers à la moitié).

Section ovale très allongée, la partie la plus étroite formant le dos; ouverture beaucoup plus haute que large.

A l'état jeune, elle présente souvent un ou plusieurs sillons en creux, analogues à ceux qui existent sur l'*Ammonites Guettardi* d'Orbigny; mais sous tous les rapports elle diffère complètement, et surtout par l'ombilic, des jeunes de cette dernière espèce.

AMMONITES FORTUNEI nov. sp.

Vallon d'Hyèges – MORIEZ



Ammonites Fortunei
(jeune).

Note : En 1892, E. Honorat-Bastide a fait connaître, sous le nom d' « *Ammonites fortunei* », une espèce nouvelle de l'Aptien du Vallon d'Hyèges (commune de MORIEZ).

KILIAN W.

Sur quelques Ammonitides appartenant au
Museum d'Histoire Naturelle de Lyon.
Archives du Mus. d'Hist. Nat. de Lyon, t. V,
1892, p. 5 - 7

Pl. I, fig. 3 a - c

PHYLLOCERAS GORETI, N. Sp.

Barrême et Hyèges (BASSES-ALPES)



Note : La même année, en 1892, W. Kilian a décrit sous le nom de « *Phylloceras Goreti* » un autre spécimen provenant du même site et se rapportant à la même espèce. La publication de W. Kilian étant plus accessible que celle d'E. Honnorat-Bastide, le nouveau taxon a reçu un temps durant l'appellation de **Goreti**.

SAYN G.

Contributions à l'étude des Céphalopodes paléocrétacés du Sud-Est de France
(Matériaux pour servir à la connaissance du Crétacé inférieur).
Mém. pour servir à l'expl. de la Carte Géol. détaillée de la France, 1920, p. 193

PHYLLOCERAS GORETI Kilian

Ph. Goreti paraît localisé aux environs d'Hyèges, où il est assez commun.


Note : G. Sayn a rappelé la présence de cette espèce dans l'aptien des environs d'Hyèges, commune de Moriez, sous le nom de *PHYLLOCERAS GORETI* (Kilian).

PETITCLERC P.

Note sur la présence de Nautilus Julii Baugier, dans le Bathonien des environs de Belfort ; suivie de la description d'espèces nouvelles ou intéressantes du Callovien des Deux-Sèvres, de Maine-et-Loire, de l'Ardèche, etc ; et enfin de l'énumération de certaines ammonites rares ou peu connues du Crétacé des Basses-Alpes.
Impr. Marcel Bon, Vesoul, 1926, p.21-23

Pl. 3, fig. 22 à 24

PHYLLOCERAS FORTUNEI, Honnorat sp.



Note : P. Petitclerc, dans son travail de 1926, a très justement fait apparaître l'antériorité de l'appellation *FORTUNEI* (Honorat-Bastide) par rapport à celle de *GORETI* (Kilian). L'appellation d'Honorat-Bastide l'emportant en antériorité sur celle de W Kilian, l'espèce doit conserver le nom donné par Honorat-Bastide : *HYPOPHYLLOCERAS FORTUNEI*.